

Що робити, якщо біль заважає рухатися вільно?



Гострий й хронічний м'язово-суглобовий біль — провідний симптом більшості широко поширених ревматичних захворювань. При цьому нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) належать до числа найбільш важливих симптоматичних лікарських засобів при такій патології завдяки поєднанню протизапальних, аналгетичних, жарознижувальних та антитромботичних властивостей (Насонов Е.Л., 2006). Найшвидшим і найпотужнішим болезаспокійливим ефектом серед НПЗП і при цьому прийнятним профілем безпеки характеризується кетопрофен (Бадюкин В.В. и соавт., 2007), що з 2015 р. представлений на українському фармацевтичному ринку брендом **АРТРОКОЛ** компанії «World Medicine» (Великобританія). Сьогодні лінійка досить нового бренду розширюється, щоб задовольнити потреби пацієнтів, тому вже у квітні 2016 р. відвідувачі аптек зможуть придбати препарат **АРТРОКОЛ у 2 лікарських формах: гелю та розчину для ін'єкцій**.

Кетопрофен, що входить до складу бренду **АРТРОКОЛ**, протягом багатьох років широко застосовується в клінічній практиці. Він чинить центральний та периферичний знеболювальний ефект та усуває прояви симптомів запально-дегенеративних захворювань опорно-рухового апарату. Його аналгетична активність є істотно вищою в порівнянні з диклофенаком і індометацином (Бадюкин В.В. и соавт., 2007). При цьому у більшості пацієнтів після внутрішньом'язового введення кетопрофен виявляється у крові вже через 15 хв, а максимальна концентрація досягається через 2 год. Він легко проникає в порожнину суглобів і надовго затримується в синовіальній рідині, тому вираженість больового синдрому та скутість суглобів зменшується на тривалий час.

Кетопрофен у складі **АРТРОКОЛУ** інтенсивно метаболізується в печінці. Його період напіввиведення з організму є коротким та становить 2 год. У ряді спеціальних клінічних досліджень було показано, що фармакокінетика кетопрофену у осіб молодого та літнього віку не має виражених відмінностей. До того ж кетопрофен не впливає негативно на суглобовий хрящ (Чичасова Н.В. и соавт., 2003). Це свідчить про те, що його застосування у пацієнтів з дегенеративними захворюваннями суглобів може мати більше переваг, ніж деяких інших НПЗП.



Ефективність кетопрофену при ревматичних захворюваннях, таких як ревматоїдний артрит, остеоартроз і анкілозуючий спондилоартрит, було продемонстровано в численних клінічних випробуваннях. До того ж кетопрофен широко використовується не тільки в ревматології, а й в інших галузях медицини: в акушерстві та гінекології, стоматології (зубний біль), хірургії (післяопераційний біль), неврології (мігрень, біль в нижній частині спини) тощо (Каратеев А.В., 2014). Таким чином, ситуації, у яких бренд **АРТРОКОЛ** буде актуальним для відвідувача аптеки:

- скарги на больовий синдром у м'язах та суглобах після травм та ушкоджень;
- протиревматична терапія у разі загострення хронічної патології (ревматоїдний артрит, остеоартрит, подагра та ін.);
- післяопераційний біль та біль при менструації (розчин для ін'єкцій **АРТРОКОЛ** за призначенням лікаря).

АРТРОКОЛ: завжди вільний рух!

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. АРТРОКОЛ (ARTROCOL) Склад. Кетопрофену — 25 мг. **Лікарська форма.** Гель. **Код АТС.** M02A A10. **Показання.** Біль у м'язах і суглобах, спричинений травмами або ушкодженнями; тендовагініти. **АРТРОКОЛ (ARTROCOL). Склад.** Кетопрофену — 100 мг. **Лікарська форма.** Розчин для ін'єкцій. **Код АТХ.** M01A E03. **Показання.** Захворювання суглобів: ревматоїдний артрит; серонегативні спондилоартрити (анкілозуючий спондилоартрит, псоріатичний артрит, реактивний артрит);подагра, псевдоподагра; остеоартрит; позасуглобовий ревматизм (тендиніт, бурсит, капсуліт плечового суглоба). Больовий синдром: люмбаго, посттравматичний біль у суглобах, м'язах; післяопераційний біль; біль при метастазах пухлин у кістки; альгодисменорея. Препарати мають протипоказання та побічні реакції. **Повна інформація про лікарські засоби міститься в інструкціях для медичного застосування.**