

Дроплекс

15 мл

Багато мам часто вважають, що тільки в маленьких дітей до трьох років можуть хворіти вуха досить часто. Виходить,

що коли діти виростуть, то і хвороби минуть. Але думка фахівців не завжди говорить про це ж. Дійсно маленькі діти страждають від болю у вушках куди частіше, ніж дорослі люди. Це можна пояснити тим, що слухова труба у маленьких дітей між середнім вухом і носоглоткою коротше і ширше, ніж у дорослих людей, таким чином інфекція легко потрапляє у вуха. Тому немовлята хворіють отитом частіше. Тобто причина болю у вусі – застуди та аденоїди.

Нежить — постійний ворог вух. Якщо лікувати вуха, але не лікувати, як слід нежить, то вуха будуть продовжувати хворіти. Не можна думати, що нежить пройде сам. Коли дитина одужує, нежить залишається, і інфекція знаходиться поблизу вух. Біль у вусі у дитини не завжди вдається відразу виявити, оскільки малюк, особливо якщо він ще не вміє розмовляти, не в змозі пояснити батькам, що його турбує, і вказати на джерело болю. Якщо є підозра на те, що дитину турбує біль у вусі, то його потрібно в терміновому порядку показати лікарю.

Біль у вусі – поширений симптом, який може турбувати як дітей, так і дорослих. Він може бути викликаний наступними причинами:

- ◆ запальні захворювання вух (отити) і сусідніх органів;
- ◆ ураження нервової системи і слухового нерва;
- ◆ патології сусідніх органів (шиї, ЛОР-органів, судин, головного мозку та ін.);
- ◆ пухлинні процеси.

Біль у вухах у дітей – досить поширена скарга на прийомі у педіатра. Найчастіше біль у вусі у дитини буває обумовлений наступними причинами:

1. **Отити** (запальні захворювання вух). Нерозвинений імунітет і анатомічні особливості вушної раковини і зовнішнього слухового проходу підвищують ймовірність розвитку отиту в дитячому віці. Нерідко отит виникає як ускладнення гострої респіраторної інфекції, викликаючи сильний біль у вусі у дитини.
2. **Ангіна** (запалення піднебінних мигдалин) – ще одне захворювання, яке нерідко може привести до болів у вухах у дитини.
3. Частіше, ніж у дорослих, у дітей зустрічаються **сторонні тіла у зовнішньому слуховому проході**.
4. **Євстахіїт**. Слухова труба у дитини ширше і коротше, ніж у дорослого, тому в неї набагато легше проникають хвороботворні організми.
5. **Епідемічний паротит** (свинка). Патологія, яка переважно зустрічається в дитячому віці. Після перенесеного епідемічного паротиту розвивається стійкий імунітет – захворювання ніколи не повторюється вдруге.
6. **Зубний біль**, найчастіше коли у малюка ріжуться зубки. При цьому наголошується загальне занепокоєння, порушення сну, апетиту, підйом температури тіла.

Що викликає отит?

Причиною появи отиту можуть стати аденоїди і їх запалення; простудні захворювання; гайморит і захворювання навколоносових пазух; безладне застосування антибіотиків; зниження імунітету; алергія; сильне охолодження організму.

Як не стати хроніком?

З самого початку вилікуйте отит до кінця. Потім протягом двох місяців стежте, щоб ваш малюк не переохолоджувався, і не захворів новою інфекцією. Необхідно уникати великих фізичних навантажень. Якщо отит проходив з гноєм, то отвір, через який витікав гній, може не затягнутися. Тому стежте, щоб дитина обов'язково цілий рік не пірнала і не купалася в басейні, річці, морі.

Декілька застережень батькам:

- ❖ Дитині не можна ходити без шапки восени і навесні, коли холодно. Тоді виникне застуда, оскільки на голові багато рефлексогенних зон. При застуді виникне нежить і заболять вуха.
- ❖ Не відкривайте вікно в машині, коли сидите спереду, а дитина позаду. Вітер дме прямо у вуха малюкові.
- ❖ Дитині не можна плавати, пірнати після отиту. Це призведе до повторного захворювання.
- ❖ Якщо дитина хвора, не перевозьте її з країни в країну, навіть якщо там, куди ви поїдете, дуже тепло. Це погіршить стан хворого через різкі перепади температур. Хвороба може дати ускладнення.
- ❖ В очікуванні зустрічі з фахівцем, прийміть знеболюючі заходи. Для цього можна використовувати вушні краплі «ДРОПЛЕКС». **ДРОПЛЕКС**, забезпечить протизапальний та знеболюючий ефект. Будь-які краплі, потрібно вірно закапувати, щоб вони дали ефект.

По-перше, температура ліків повинна відповідати температурі тіла. Щоб підігріти розчин до потрібної температури, поставте флакончик з краплями в кухоль з теплою водою або потримайте в руках деякий час.

По-друге, краплі повинні потрапити на барабанну перетинку. Для цього лежачи на боці, повернувши голову в потрібну сторону, гарненько відтягніть вушну раковину у дорослого вгору і дозад, а у дитини вниз і дозад.

краплі вушні, розчин

Дроплекс

15 мл

- ❖ Варто пам'ятати, що правильне і ефективне лікування причин болю у вусі може здійснювати тільки професійний ЛОР-лікар. Тому після того, як перша допомога була надана, слід якомога швидше звернутися за допомогою в медичний заклад! Тільки лікар зможе призначити грамотне лікування.

Забудьте про вушну біль, будьте здорові та щасливі!



Дроплекс

ФЕНАЗОН

Анальгетик-антипіретик
з протизапальною
та анальгезуючою дією

+

**ЛІДОКАЇНУ
ГІДРОХЛОРИД**

Місцевий
анестетик



ШВИДКА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ БОЛЮ У ВУХАХ!*

Дроплекс

краплі вушні, розчин

15 мл

Феназон
45,5 мг
+
Лідокаїну
гідрохлорид
11,4 мг



ШВИДКА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ БОЛЮ У ВУХАХ!*

Дроплекс

краплі вушні, розчин

15 мл

Феназон
45,5 мг
+
Лідокаїну
гідрохлорид
11,4 мг



5-15 хв

Зменшує біль протягом
5-15 хвилин після
застосування*

Комбінований препарат,
що має анестезуючу
та протизапальну дію**

*Франціас М. Ефективність і безпеку ушних крапель феназон+лідокаїн у дітей младшого і середнього віку при серйозному отиті // *Annales de pediatrie*. – 1993. – Том 40. – №7.

**Інструкція.

ДРОПЛЕКС. Показання. Місцеве симптоматичне лікування певних больових станів середнього вуха з інтактною барабанною перетинкою у дітей віком від 1 місяця та дорослих при: середньому отиті у гострому періоді; фліктенульозному вірусному отиті; баротравматичному отиті. **Протипоказання.** Гіперчутливість до діючих речовин, до інших компонентів препарату або до амідних місцевоанестезуючих лікарських засобів. Перфорація барабанної перетинки травматичного або інфекційного походження. **Побічні реакції.** При застосуванні препарату можливі розвиток місцевих реакцій: алергічні реакції, включаючи подразнення, гіперемію, зовнішнього слухового проходу, свербіж, шкірні висипання. **Категорія відпуску.** Без рецепта. **Виробник.** К.О. «Ромфарм Компані С.РЛ», Румунія. **Заявник.** УОРЛД МЕДИЦИН ЛТД. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України №1049 від 04.09.2017 р. РП №УА/12428/01/01. Інформація надана скорочено. З повною інформацією про препарат можна ознайомитися в інструкції для медичного застосування препарату. Перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією для медичного застосування препарату. Інформація надана на правах реклами.

Показання до застосування

Для місцевого симптоматичного лікування дітей (у т. ч. немовлят) та дорослих при:

- 👉 гострому середньому отиті;
- 👉 отиті, який є ускладненням після грипу;
- 👉 баротравматичному отиті.

Тел.: +38 044 495 25 30 / e-mail: info@wm-marketing.com.ua

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я