

Спрей ТЕРБИНОРМ: преодолей грибок с легкостью

Увеличивается количество солнечных дней, столбик термометра стремится вверх, активно преображается природа, изменяется настроение и, конечно, наш гардероб. Все больше открытых вещей и контакта с окружающим миром. С наступлением тепла повышается риск травматизации открытой кожи стоп и ногтей, напряженная работа системы терморегуляции организма приводит к повышению потливости, в том числе стоп, формируются благоприятные условия для развития грибковой инфекции. Скрыть эту не только косметическую проблему трудно, кроме того, она становится очевидной для окружающих. Поэтому самое время приобрести современное эффективное противогрибковое средство.

Среди противогрибковых препаратов заслуженную популярность завоевал тербинафин благодаря выраженному фунгицидному действию в отношении широкого спектра дерматофитов, плесневых и диморфных грибов, а также его безопасности. ТЕРБИНОРМ спрей (производство — Румыния) является местным препаратом тербинафина для лечения грибковых инфекций кожи, вызванных дерматофитами рода *Trichophyton*, *Microsporum canis* и *Epidermophyton floccosum*. Препарат целесообразно использовать при таких часто встречающихся микозах, как межпальцевая эпидермофития стоп («стопа атлета»), паховая дерматофития («зуд жокея»), дерматофития туловища (стригуший лишай), а также при разноцветном лишае, вызванном *Pityrosporum orbiculare* (*Malassezia furfur*).

Механизм действия тербинафина направлен на ферментные системы гриба, которые имеют низкое сродство к системе цитохрома человека (Бурбелло А.Т., 2007). Именно поэтому препарат не оказывает влияния на синтез стероидных структур человека (холестерин, гормоны) (Зайченко А.В., 2013). Многие лекарственные средства метаболизируются системой цитохрома P450. Тербинафин обладает значительной метаболической нейтральностью и мало вступает в фармакокинетические взаимодействия с другими препаратами (Штрыголь С.Ю., 2006). Таким образом, тербинафин является антимикотиком первого выбора для пациентов, получающих медикаментозную терапию по поводу сопутствующих заболеваний (Вашенко О.О. и соавт., 2009). В пожилом возрасте необходимо учитывать выраженность системного действия и, соответственно, возможных системных побочных реакций применяемых препаратов. ТЕРБИНОРМ спрей действует исключительно в месте нанесения, так как абсорбируется менее 5% нанесенной дозы тербинафина.

Клиническое течение микоза часто осложняется бактериальная флора, поэтому терапия должна быть комплексной и включать препараты с анти-

микробным и противовоспалительным действием. В исследованиях была отмечена высокая активность наружных форм тербинафина против грамположительных и грамотрицательных бактерий (Болотная М.А., 2012). Форма спрея позволяет равномерно распределять препарат по поверхности кожи. ТЕРБИНОРМ спрей удобен и прост в применении, обеспечивает быструю обработку очагов грибкового поражения, что особенно важно при наличии очагов большой площади или их локализации в складках кожи, между пальцами ног. Следует отметить, что помимо противогрибкового действия, тербинафин обладает высокой противовоспалительной активностью и выраженными антибактериальными свойствами, а благодаря липо- и кератофильности быстро впитывается в кожу, смягчая ее (Климова И.Я. и соавт., 2007). Форма спрея оказывает освежающий, подсушивающий, противовоспалительный и противозудный эффекты. Еще одно преимущество ТЕРБИНОРМ спрея заключается в том, что препарат не имеет запаха, цвета и не оставляет следов на одежде. Курсовое лечение ТЕРБИНОРМ спреем составляет 7 дней. Применяется препарат 1 раз в сутки, при этом создаются терапевтические концентрации тербинафина в слоях кожи, которые сохраняются до 1 нед, чем обусловлено посттерапевтическое действие препарата.

Тербинафин в форме спрея представляет интерес в качестве профилактического средства для предупреждения грибковых инфекций в случае повышенного риска заражения грибом: при посещении общественных мест (сауны, спортзалы, бассейны), наличии микоза у членов семьи, снижении иммунной защиты, на фоне длительной антибиотикотерапии, а также для обработки обуви (снижение риска самозаражения).

Таким образом, **ТЕРБИНОРМ спрей — необходимый препарат в домашней или дорожной аптечке. Спрей ТЕРБИНОРМ: попрощайся с грибком!**

Пресс-служба «Еженедельника АПТЕКА»

ПОДОЛАЙ ГРИБОК З ЛЕГКІСТЮ

ТЕРБІНОРМ

спрей

20 мл
10,08 мг/мл тербінафіну



- Комфортне лікування^{1,2}
- Зручне застосування^{1,2}
- Надійний ефект^{1,3}

- Показаний при грибкових інфекціях шкіри⁴
- Зменшує запалення тканин^{5,6,8}
- Застосовується 1 раз на добу⁴
- Курс лікування 1 тиждень⁴
- Можливість профілактичного застосування^{7,8}

Реклама лікарського засобу. Тербіноорм спрей. **Склад:** діюча речовина – тербінафін. **Лікарська форма.** Спрей нашірний, розчин, 20 мл. **Механізм дії.** Має широкий спектр протигрибкової дії. **Показання до застосування.** Грибкові інфекції шкіри, стригучий дерматомікоз, різнобарвний лишай. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до тербінафіну або до будь-якого компонента препарату. **Можливі побічні ефекти,** в тому числі місцеві симптоми, такі як свербіж, пущення або печіння шкіри, біль та подразнення у місці нанесення, порушення пігментації. **Категорія відпуску.** Без рецепта. **Виробник.** К.О. «Ромфарм Компані С.Р.Л.», Румунія. **Заявник.** РОТАФАРМ ЛІМІТЕД, Великобританія. Р.л. № UA/13367/01/01 наказ МОЗ України № 661 від 09.10.15 р. Інформація надана скорочено. З повною інформацією про препарат можна ознайомитися в інструкції для медичного застосування препарату. Інформація для медичних та фармацевтичних працівників, а також для розповсюдження в рамках спеціалізованих заходів з медичної тематики.

Джерела: 1. Битов Ю.С., Васенова В.Ю. Современные возможности применения тербинафина для лечения грибковых заболеваний. – «РМЖ». – № 11 от 10.05.2012, с. 582. 2. Kyle A. A., Dahl M.V. Topical therapy for fungal infections. Am J Clin Dermatol. 2004;5(6): 443-51. Review. 3. Brown M., Evans C., Muddle A., Turner R., Lim S., Reed J., Traynor M. Efficacy, tolerability and consumer acceptability of terbinafine topical spray versus terbinafine topical solution: a phase IIa, randomised, observer-blind, comparative study. Am J Clin Dermatol. 2013 Oct; 14(5):413-9. 4. Інструкція для медичного застосування препарату. 5. Рыженко И.М., Редькин П.Г. Выбор противогрибковых препаратов для местной терапии поверхностных микозов в условиях аптеки //Провизор, 2010, № 11. 6. Халдин А.А., Цыкин А.А., Изомова И.М. Клинико-этиологическая эффективность 1% спрея Ламизил® при лечении грибковых поражений крупных складок кожи //Российский журнал кожных и венерических болезней. 2007. № 1: с. 56. 7. Б.Г. Коган, Е.А. Верба. Опыт клинического применения местного антимикотика Тербиноорм спрей в практике врача дерматовенеролога. // http://medstrana.com/articles. 8. Болотная Л.А. Роль тербинафина в терапии грибковых поражений кожи. //Український журнал дерматології, венерології, косметології. № 4 (47) 2012.

За додатковою інформацією звертайтеся за тел.: +380 567 905 509/e-mail: info@rotapharm.com.ua