

Применение пантопразола в профилактике НПВП-гастропатии

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — обширный класс лекарственных средств, обладающих сразу несколькими важными терапевтическими свойствами. Высокая эффективность НПВП сделала их одними из самых назначаемых в современном здравоохранении препаратов. К сожалению, с основным механизмом действия НПВП (блокирование циклооксигеназы — ключевого фермента в воспалительных реакциях) связаны и побочные эффекты, которые, несмотря на создание современных высокоселективных форм препаратов, остаются серьезной проблемой медицины.



Установлено, что назначение препарата Улсепан в дозе 40 мг/сут на фоне приема НПВП позволило избежать развития желудочно-кишечных кровотечений у всех больных, входящих в группу профилактики.

НПВП-гастропатии — насколько это серьезно?

К наиболее частым побочным эффектам применения НПВП относят НПВП-гастропатию. Ее развитие связывают с блокированием препаратами одной из изоформ циклооксигеназы (ЦОГ-1), контролирующей синтез цитопротекторных простагландинов. Уменьшение количества и активности последних снижает устойчивость слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) к негативному воздействию соляной кислоты и пепсина.

НПВП-гастропатии сопровождаются эрозивными повреждениями и изъязвлениями слизистой оболочки ЖКТ. В наиболее тяжелых случаях (составляющих до 4%) отмечаются желудочно-кишечные кровотечения и перфорация. Причем НПВП-гастропатии нередко (до 50% случаев) протекают без выраженной клинической симптоматики, что затрудняет своевременную диагностику заболевания.

Высокая частота поражений ЖКТ на фоне приема НПВП диктует острую необходимость в проведении профилактических мероприятий, которые бы снизили такие риски. Особенно это важно учитывать при отягощающих обстоятельствах: применение НПВП в высоких дозах и продолжительное время, пожилой возраст пациента, наличие у него вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем), сопутствующей гастроэнтерологической патологии.

Оптимальная профилактика НПВП-гастропатий

Существенно снизить риски развития НПВП-гастропатий позволяют ингибиторы протонной помпы (ИПП). Подбор эффективного ИПП, снижающего секреторную активность желудка, дает возможность предотвратить повреждение соляной кислотой слизистой оболочки ЖКТ, в т. ч. на фоне снижения ее цитопротекторных свойств, вызванных применением НПВП. Благодаря своему механизму действия ИПП длительный период времени поддерживают интрагастральный pH на значениях выше 4, что позволяет эффективно использовать препараты этой группы также и в лечении пациентов с развившейся НПВП-гастропатией.

Особое внимание в контексте проблемы НПВП-гастропатий заслуживает пантопразол, оказывающий пролонгированный кислотоснижающий эффект при минимальном количестве нежелательных побочных



Улсепан



Пантопрозол

ЕФЕКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ КИСЛОТНОСТІ^{1, 2}



14 таблеток
кишкворозчинних



- Наявність найбільшої рН-селективності серед інших ІПП, що забезпечує більшу безпечність та меншу кількість побічних реакцій³
- Забезпечення оптимального рівня кислотності 24 години на добу²
- Ефективність та безпечність тривалого прийому при рефлюкс-езофагіті² та інших кислотозалежних захворюваннях⁴

¹ Scholten T. et al. Once-daily pantoprazole 40 mg and esomeprazole 40 mg have equivalent overall efficacy in relieving GERD-related symptoms // Aliment Pharmacol Ther 2003; 18: 587-594.

² Інструкція для медичного застосування препарату Улсепан.

³ Губергриц Н.Б., Бондаренко О.А. Оптимізація лікування хронічного панкреатиту в поєднанні з гастроєзофагеальною рефлюксною хворобою у хворих з ожирінням і інсулінорезистентністю. // Сучасна гастроентерологія.-2014.-№2.-С. 55-67.

⁴ Палій І.Г. Пантопрозол — інгібітор протонної помпи з доведеною переносимістю, безпечністю та ефективністю. // Сучасна гастроентерологія. — 2013. — №12. — С. 97-102.

УЛСЕПАН. Показання. Рефлюкс-езофагіт середнього та важкого ступеня; ерадикація *Helicobacter pylori* у пацієнтів з пептичними виразками, спричиненими цим мікроорганізмом, у комбінації з певними антибіотиками; виразка шлунка та дванадцятипалої кишки; синдром Золлінгера-Еллісона та інші патологічні гіперсекреторні стани. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до активної речовини, похідних бензimidазолу та будь-якого компоненту препарату. **Побічні реакції.** Виникнення побічних реакцій спостерігалось у близько 5% пацієнтів. Найчастіші побічні реакції — діарея і головний біль (близько 1%). **Діти.** Таблетки не слід застосовувати дітям віком до 12 років. **Категорія відпуску.** За рецептом. **Заявник.** «УОРЛД МЕДИЦИН ЛІМІТЕД», Велика Британія. **Виробник.** «Біофарма Іпан Сан. ве Тідж. А.Ш.», Туреччина. РП таблетки UA/12747/01/01 від 15.02.2013. Зміни внесено Наказ МОЗ України 10.07.2014 №483. РП ліофілізат для розчину для ін'єкцій UA/14453/01/01 від 24.06.2015. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України №128 від 15.02.2013 р. Рєстраційне посвідчення №UA/12747/01/01. Зміни внесено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України №483 від 10.07.2014 р. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України №373 від 24.06.2015 р. Рєстраційне посвідчення №UA/14453/01/01. Інформація надана скорочено. З повною інформацією про препарат можна ознайомитися в інструкції для медичного застосування препарату. Інформація для медичних та фармацевтичних працівників, а також для розповсюдження в рамках спеціалізованих заходів з медичної тематики. Інформація про рецептурний лікарський засіб для професійної діяльності спеціалістів у галузі охорони здоров'я.

явлений (Казюлин А. Н., Калягин И. Е., 2012). Благодаря структуре молекулы, устойчивой к действию системы цитохрома P450, пантопрозол длительное время сохраняется в биодоступной форме в терапевтически эффективных концентрациях. Низкий потенциал лекарственных взаимодействий пантопрозола дает возможность назначать его с другими препаратами, в т. ч. с клопидогрелем, у пациентов после инфаркта миокарда для снижения риска желудочно-кишечного кровотечения (Губергриц Н. Б., 2012).

Улсепан — препарат пантопрозола с доказанной эффективностью

На украинском рынке компанией «World Medicine» представлен препарат пантопрозола Улсепан, доказавший свою эффективность в профилактике НПВП-гастропатий как в клинических исследованиях, так и при использовании в практическом здравоохранении.

Особый интерес представляют результаты исследования, проведенного в клинике ГУ «Национальный институт терапии им. Л. Т. Малой НАМН Украины» (Колесникова Е. В., Соломенцева Т. А., 2016). Установлено, что назначение препарата Улсепан в дозе 40 мг/сут на фоне приема НПВП позволило избежать развития желудочно-кишечных кровотечений у всех больных, входящих в группу профилактики. В группе пациентов с наличием симптомов НПВП-гастропатии, на фоне приема препарата Улсепан уже на 3–4-й день приема отмечалось купирование боли, снижение выраженности диспептических явлений, эпителизация эрозий и язв.

Врачам первичного звена необходимо учитывать актуальность и распространенность проблемы НПВП-гастропатий, требующей проведения профилактических мероприятий. Особое внимание специалистов заслуживает препарат пантопрозола Улсепан, доказавший свою высокую эффективность в профилактике и лечении этой патологии.

Список литературы находится в редакции.

Анатолий Степура



WORLD MEDICINE
Pharmaceutical Company

Додаткова інформація за тел.: (044) 495 25 30 • e-mail: info@worldmedicine.ua

www.worldmedicine.ua